CANNA HYDRO

		Zuchtdauer in Wochen	Licht / Tag in Stunden	Hydro Vega ml A /10 Liter ml B /10 Liter	Hydro Flores ml A /10 Liter ml B /10 Liter	RHIZOTONIC ml /10 Liter	CANNAZYM ml /10 Liter	CANNABOOST ml /10 Liter	PK 13/14 ml /10 Liter	EC + in mS/cm	EC gesamt in mS/cm
	VEGETATIVE PHASE										
WACHSTUM	**Erste Wurzelbildung (3-5 Tage)** - Befeuchtung des Hydro-Substrats	<1	18	10-20	-	40	-	-	-	0,7 - 1,1	1,1 - 1,5
WACHSTUM	**1. vegetative Phase** - Pflanze zeigt starkes vegetatives Wachstum	0-3[1]	18	15-25	-	20	25	-	-	0,9-1,3	1,3-1,7
BLÜTE	**2. vegetative Phase** - bis zum Wachstumsstillstand nach Ausbildung der Blütenanlagen oder Fruchtansätze	2 - 4[2]	12	20-30	-	20	25	20[5]	-	1,2-1,6	1,6-2,0
	GENERATIVE PHASE										
BLÜTE	**1. generative Phase** - Längenwachstum der Blüten- oder Fruchtstände Pflanze wächst nicht länger in die Höhe	2 - 3	12	-	25-35	5	25	20 - 40	-	1,4- 1,8	1,8-2,2
BLÜTE	**2. generative Phase** - Blüten- oder Fruchtstände werden kompakter (Breite)	1	12	-	25-35	5	25	20 - 40	15	1,5-1,9	1,9-2,3
BLÜTE	**3. generative Phase** - Blüten- oder Fruchtstände werden schwerer (Gewicht)	2 - 3	12	-	15-25	5	25	20 - 40	-	1,0-1,4	1,4-1,8
BLÜTE	**4. generative Phase** - Abreifung der Blüten- oder Fruchtstände	1 - 2	10 - 12[3]	-	-	-	25 - 50[4]	20 - 40	-	0,0	0,4

1. Die Länge dieser Phase variiert pro Sorte und Pflanzdichte. Mutterpflanzen bleiben bis zum Schluss in dieser Phase (6-12 Monate).
2. Die Umstellung der Beleuchtungsdauer von 18 auf 12 Stunden variiert pro Sorte. Als Faustsregel gilt, dass nach 2 Wochen umgestellt wird.
3. Den Lichtzyklus reduzieren, wenn die Reifung zu schnell verläuft. Achten Sie auf eine steigende relative Luftfeuchtigkeit.
4. Die CANNAZYM-Dosierung auf 50 ml/10 Liter verdoppeln, wenn das Substrat wiederverwendet wird.
5. Standarddosierung 20 ml/10 l. Für mehr Blühkraft auf maximal 40 ml/10 l erhöhen.

EC-Wert: Der EC+-Wert in mS/cm beruht auf EC-Wert von Wasser = 0,0 auf 25°C, pH-Wert: 6,0. Den EC-Wert des verwendeten Leitungswassers zum empfohlenen EC-Wert addieren! Bei den als Beispiel genannten EC-Richtwerten wird von Leitungswasser mit einem EC-Wert von 0,4 ausgegangen.

pH-Wert: Der empfohlene pH-Wert liegt zwischen 5,2 und 6,2. Durch Beigabe von pH- kann der EC-Wert erhöht werden. Verwenden Sie pH- Wuchs in der vegetativen Phase, um den pH-Wert zu senken.

Die in der Tabelle angegebenen Richtwerte sind keine verbindlichen Mindest- oder Höchstwerte, können aber unerfahrenen Züchtern dabei helfen, eine ausgeklügelte, Düngestrategie zu entwickeln. Eine optimale Düngestrategie hängt außerdem von bestimmten Faktoren ab, wie z. B.: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Pflanzensorte, Durchwurzelung, Feuchtigkeitsgehalt im Substrat, Bewässerungsstrategie usw.

CANNA
The solution for growth and bloom

Erstellen Sie Ihr eigenes Dosierschema auf www.canna.com

CANNA

HYDRO

CANNA

The solution for growth and bloom