



TAGE UND WOCHEN LICHTZYKLUS	VEGETATIVE PHASE				GENERATIVE PHASE						
	BEWUR- ZELUNG	I	II		I			II	III	IV	
	T1-5	T6-25	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dosierung in ml pro 10L											
CANNA AQUA VEGA A	21 - 28	25 - 32	28 - 36	28 - 36							
CANNA AQUA VEGA B	21 - 28	25 - 32	28 - 36	28 - 36							
CANNA AQUA FLORES A					30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	26 - 34	26 - 34	
CANNA AQUA FLORES B					30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	26 - 34	26 - 34	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNA BOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
mS/cm											
EC WASSER ***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC DÜNGER	1,2 - 1,6	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	
EC GESAMT	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,2 - 2,7	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	0,2

Dieser Anbauplan ist für Pflanzen gedacht, die Blüten oder Früchte entwickeln, beginnend mit einem einwöchigen Steckling oder Sämling. Die Dauer jeder Phase kann je nach Art variieren.

- * Verdopple die CANNAZYM-Dosierung auf 50 ml/10 L, wenn das Substrat wiederverwendet wird.
- ** Erhöhe CANNABOOST während der Blütephase auf maximal 40 ml/10 L, um eine zusätzliche Stärkung zu erzielen.
- *** Die Dosierung von CANNA CALMAG AGENT hängt vom EC-Wert des Wassers ab, der idealerweise zwischen 0,2 und 0,4 mS/cm liegen sollte. Wenn das Ausgangswasser einen EC-Wert von 0,0 hat, kann Calmag in der maximalen Dosierung angewendet werden, um einen EC-Wert von 0,4 mS/cm zu erreichen. Wenn der Ausgangswert des Wassers bereits über 0,0 liegt, sollte eine geringere Dosis Calmag verwendet werden. Dieser Beispielplan geht von einem EC-Wert des Wassers von 0,2 mS/cm aus (angepasst mit Calmag).

pH-Wert: Der empfohlene pH-Wert liegt zwischen 5,2 und 6,2. Durch Beigabe von pH- kann der EC-Wert erhöht werden. Verwenden Sie pH- Wuchs in der vegetativen Phase, um den pH-Wert zu senken.

Für eine längere Wachstumsphase wiederhole die empfohlenen Dosierungen aus der vegetativen Phase I (D6-25). Für eine längere Blütephase wiederhole die empfohlenen Dosierungen aus der generativen Phase I (W3-W5). Füge CANNA PK13/14 in den 3-4 Wochen vor der Ernte hinzu.





TAGE UND WOCHEN LICHTZYKLUS	VEGETATIVE PHASE				GENERATIVE PHASE						
	BEWUR- ZELUNG	I	II		I			II	III	IV	
	T1-5	T6-25	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dosierung in ml pro 10L											
CANNA HYDRO VEGA A (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT ***	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC WASSER ***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC DÜNGER	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,2 - 1,6	
EC GESAMT	1,6 - 2,0	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,2 - 2,7	1,6 - 2,0	1,4 - 1,8	0,2

Dieser Anbauplan ist für Pflanzen gedacht, die Blüten oder Früchte entwickeln, beginnend mit einem einwöchigen Steckling oder Sämling. Die Dauer jeder Phase kann je nach Art variieren.

- * Verdopple die CANNAZYM-Dosierung auf 50 ml/10 L, wenn das Substrat wiederverwendet wird.
- ** Erhöhe CANNABOOST während der Blütephase auf maximal 40 ml/10 L, um eine zusätzliche Stärkung zu erzielen.
- *** Die Dosierung von CANNA CALMAG AGENT hängt vom EC-Wert des Wassers ab, der idealerweise zwischen 0,2 und 0,4 mS/cm liegen sollte. Wenn das Ausgangswasser einen EC-Wert von 0,0 hat, kann Calmag in der maximalen Dosierung angewendet werden, um einen EC-Wert von 0,4 mS/cm zu erreichen. Wenn der Ausgangswert des Wassers bereits über 0,0 liegt, sollte eine geringere Dosis Calmag verwendet werden. Dieser Beispielplan geht von einem EC-Wert des Wassers von 0,2 mS/cm aus (angepasst mit Calmag).

pH-Wert: Der empfohlene pH-Wert liegt zwischen 5,2 und 6,2. Durch Beigabe von pH- kann der EC-Wert erhöht werden. Verwenden Sie pH- Wuchs in der vegetativen Phase, um den pH-Wert zu senken.

Für eine längere Wachstumsphase wiederhole die empfohlenen Dosierungen aus der vegetativen Phase I (D6-25). Für eine längere Blütephase wiederhole die empfohlenen Dosierungen aus der generativen Phase I (W3-W5). Füge CANNA PK13/14 in den 3-4 Wochen vor der Ernte hinzu.



CANNA HYDRO HARTES WASSER

DÜNGERSCHEMA



ONLINE
ZUCHTANLEITUNG

TAGE UND WOCHEN LICHTZYKLUS	VEGETATIVE PHASE				GENERATIVE PHASE						
	BEWUR- ZELUNG	I	II		I			II	III	IV	
	T1-5 18	T6-25 18	W1 12	W2 12	W3 12	W4 12	W5 12	W6 12	W7 12	W8 12	W9 12
Dosierung in ml pro 10L											
CANNA HYDRO VEGA A (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC WASSER	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
EC DÜNGER	1,5 - 1,9	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	2,0 - 2,4	1,4 - 1,9	1,2 - 1,7	
EC GESAMT	2,1 - 2,5	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,6 - 3,0	2,0 - 2,5	1,8 - 2,3	0,6

Dieser Anbauplan ist für Pflanzen gedacht, die Blüten oder Früchte entwickeln, beginnend mit einem einwöchigen Steckling oder Sämling.
Die Dauer jeder Phase kann je nach Art variieren.

- * Verdopple die CANNAZYM-Dosierung auf 50 ml/10 L, wenn das Substrat wiederverwendet wird.
- ** Erhöhe CANNABOOST während der Blütephase auf maximal 40 ml/10 L, um eine zusätzliche Stärkung zu erzielen.

pH-Wert: Der empfohlene pH-Wert liegt zwischen 5,2 und 6,2. Durch Beigabe von pH- kann der EC-Wert erhöht werden. Verwenden Sie pH- Wuchs in der vegetativen Phase, um den pH-Wert zu senken.

Für eine längere Wachstumsphase wiederhole die empfohlenen Dosierungen aus der vegetativen Phase I (D6-25). Für eine längere Blütephase wiederhole die empfohlenen Dosierungen aus der generativen Phase I (W3-W5).
Füge CANNA PK13/14 in den 3-4 Wochen vor der Ernte hinzu.

